



Bogotá D.C. 4 de Agosto de 2010.

COMUNICADO DE PRENSA

El cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte en mujeres con cáncer. Pese a ello, recientes estudios permitieron observar una notoria tendencia al descenso de la mortalidad por cáncer de cuello de uterino en la mayoría de los departamentos del País.

La incidencia del cáncer de cuello uterino en Colombia, según reportes 2002 – 2006, es de 5.603 casos nuevos al año, atribuyéndose al 14,5% del total de los casos de cáncer en mujeres.

Según Fuente Atlas 2000- 2006: al año se producen cerca de 1.953 muertes por cáncer de cuello uterino en mujeres. Sin embargo, este tipo de cáncer aún sigue ocupando el primer lugar de causa de muerte en mujeres, seguido del cáncer de seno.

Discusión del Atlas:

Se observó una notoria tendencia al descenso de la mortalidad por cáncer de cuello de útero en la mayoría de los departamentos del País, lo que se reflejó en un descenso significativo a nivel nacional: para el periodo 1985-2006 la disminución fue de 1,6% promedio anual y para el periodo 2000-2006 de 3,7% promedio anual.

Incidencia estimada 1995 -1999: 32,8 por 100.000 mil (5.936 casos nuevos)

Incidencia estimada 2002 -2006: 28,2 por 100.000 mil (5.603 casos nuevos)

Argumentos expuestos:

- Mejor acceso, por incremento en la cobertura de afiliación al sistema de salud.
- Aumento en la cobertura de la citología vaginal que pasó de 68% a finales en 1998 a 76% en 2005.
- Metas específicas de reducción de la mortalidad por este cáncer en los últimos planes de salud pública.