




Cáncer de cuello uterino

¿Conoce usted su riesgo?




Virus del Papiloma Humano (VPH) principal infección de transmisión sexual

Alrededor del **70% - 80%** de los adultos que han tenido vida sexual, adquieren el VPH



En Colombia se estiman anualmente más de **3853 nuevos casos** de cáncer de cuello uterino y mueren más de **1775 mujeres** por esta causa

Hay más de 100 tipos de VPH. Los tipos **16 y 18** son los responsables de casi el **70%** de los cánceres de cuello uterino



No todas las mujeres infectadas con VPH desarrollan cáncer, pero todas las mujeres con cáncer de cuello uterino, han tenido el virus




Es la **quinta** causa de muerte por cáncer en las mujeres en Colombia.

Prevención y detección temprana

- En **Colombia** es gratuita para niñas escolarizadas de **9 a 17** años
- Es **segura**, se han distribuido más de **270 millones de dosis** en todo el mundo
- **Preferiblemente** debe ser aplicada en mujeres que **no han** iniciado vida sexual

- **Prueba de inspección visual** con ácido acético y lugol
- Es eficaz especialmente para **mujeres de regiones apartadas** con difícil acceso a la salud
- Mujeres entre los **30 y 50** años
- Esta prueba debe realizarse **cada 3 años**, si los resultados son negativos



- Permite **identificar el riesgo de cáncer** antes que se presente
- Está incluida en el **PBS: Plan de Beneficios en Salud** (antiguo POS)
- Recomendada para mujeres entre **30 a 65** años de edad, en intervalos de cada cinco años, cuando los resultados han sido negativos

- Se realiza en mujeres de **25 a 29 años** y en menores de 25 años se realiza si **presentan factores de riesgo**
- Esta prueba debe realizarse **cada 3 años** ante resultados normales.